

- ကန်သင်းများကို ခိုင်ခန့်အောင်ပြုလုပ်ပြီး ကြွက်တွင်းများ မရှိစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။
- ရေလွှမ်းနေစဉ်အတွင်း ဒီရေကျချိန်တွင် ကွင်းအတွင်းမှ ရေထုတ်ပါ။ မရိတ်မီ ၂ ပတ်အလိုတွင် ရေဖောက်ထုတ်ပါ။

၇။ ပေါင်းမြက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

- မြေကိုပေါင်း ကင်းစင်အောင် ထယ်ထိုးထွန်ယက်ပါ။ ပထမ အကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် မြေပြင်ချိန်အတွင်း ပေါင်းမြက်များ စုံလင်အောင် ပေါက်ပါစေ။ မြေကို ၇-၁၀ ရက်ခြား၍ ထယ်ထိုးထွန်ပေ။
- ရွှေ့ပြောင်းမစိုက်မီ သမန်းပြင်ပြီး မြက်ခေါင်းကောက်ပါ။
- အတန်းလိုက်စိုက်ပါက ရေထုတ်ပြီး သမန်းနီးကိရိယာဖြင့် ကြားပေါင်းလိုက်ပါ။
- ပေါင်းနှိမ်နင်းခြင်းနှင့် လက်ပေါင်းလိုက်ခြင်းကို စပါးစိုက်ပြီး ၃၀ - ၄၅ ရက် မတိုင်မီ အပြီးဆောင်ရွက်ပါ။
- ရေလွှမ်းနှစ်မြုပ်သော နေရာအများစုတွင် ပေါင်းပြဿနာ ကျရောက်မှု နည်းသော်လည်း တိုက်ရိုက်အစေ့ချစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ပေါင်းမြက်ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်လေ့ရှိပါက ပေါင်း အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပေါင်းသတ် ဆေးကို ဆေးညွှန်းတွင် ပါဝင်သော ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ထောက်ခံနှုန်းထားအတိုင်း စနစ်တကျ အသုံးပြုပါ။ ဥပမာ၊ အဓိက ကျရောက်သော ပေါင်းအမျိုးအစားသည် မြက်နှင့် မြက်မဲ့ညင်းမျိုးရင်းများ ဖြစ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပေါင်းသတ် ဆေးတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။



ပေါင်းသတ်ဆေး အမည်	တစ်ဧကအတွက် ဆေးနှုန်းထား (g a.i./ac)	အသုံးပြုရမည့် အချိန်
ပေါင်းပင်ပေါက်မီ အသုံးပြုရသော ပေါင်းသတ်ဆေး Pretilachlor+safener	၁၅၀-၃၀၀ ml EC a.i.	စပါးစိုက်ပြီး ၃ ရက် အကြာ
ပေါင်းပင်ပေါက်ပြီးမှ အသုံးပြုရသော ပေါင်းသတ်ဆေး Fenoxaprop + Ethoxy Sulfuron	၃၁ ml EC a.i.	စပါးစိုက်ပြီး ၁၀ - ၂၀ ရက် အကြာ
ပေါင်းပင်ပေါက်ပြီးမှ အသုံးပြုရသော ပေါင်းသတ်ဆေး Bispyribic-sodium	၅-၈ ml SL a.i.	စပါးစိုက်ပြီး ၁၄ - ၂၂ ရက် အကြာ

၈။ ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

- ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှု ရှိ/မရှိကို အမြဲမပြတ် ကွင်းဆင်း၊ ကင်းထောက်၊ စစ်ဆေးပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။
- စပါးပင်ဖြစ်ထွန်းမှု အစောပိုင်းကာလ(၃၀-၄၀)ရက်အတွင်း ပိုးမွှားကျရောက်မှုကြောင့် အရွက်များပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက စပါးပင်မှ အစားထိုး ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ပါသည်။
- ပိုးမွှားရောဂါများ ရှင်သန်ခိုအောင်းရာ နေရာဖြစ်သော ပေါင်း ပင်များနှင့် ပင်ကြင်း၊ ပင်ကျန်များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။
- ကြွက်ကြောင့်သီးနှံလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန် (က) ပတ်ဝန်းကျင် သီးနှံခင်းများနှင့် စိုက်ချိန်/ ရိတ်ချိန် ညီအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
(ခ) စိုက်ခင်းနှင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါင်းမြက် ကင်းစင် အောင် ရှင်းလင်းပါ။
(ဂ) ကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများကို သားမပေါက် ခင်အချိန်တွင်လက်ဦးမှ ရယူနှိမ်နင်းနိုင်ရန်အတွက် စိုက် ချိန်တွင် တစ်ကြိမ် သီးနှံမပေါ်ခင်တွင် တစ်ကြိမ် မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

(ဃ) ကြွက်ထောင်ချောက်ထောင်ခြင်း၊ ကြွက်ကျင်းများ တူးဖော်၍ ကြွက်ဖမ်းခြင်း၊ ကြွက်များအား လူအင်အားဖြင့် ခြောက်လှန့် ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ကြွက်ကာပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်း၊ ထောင်ချောက် သီးနှံဖြင့် ကြွက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း (Trap Barrier System)၊ ကြွက်တို့၏ သားရဲကောင်များ မွေးမြူခြင်း၊ ကြွက်မုဆိုးများ၏ အကူအညီရယူ၍ ကြွက်ဖမ်းခြင်း၊ ကြွက် ဆေးချခြင်း လုပ်ငန်းများကို လူထုလှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြင့် တစ် ကွင်းတစ်ဆက်တည်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၉။ ရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းစနစ်များ

- မောင်းညံ့ချိန် (စပါးအနှံ၏ ၈၀-၈၅ % ရင့်မှည့်ချိန်)တွင် ရိတ်သိမ်းပြီး ချက်ချင်းခြွေလှေ့ပါ။
- ၂ - ၃ ရက် နေဖြင့် အခြောက်လှန်းပါ။ လိုအပ်ပါက အခြောက် ခံ ကိရိယာ အသုံးပြုပြီး အပူချိန် ကို ၄၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ခန့် ထား၍ အခြောက်ခံပါ။
- ကွန်ကရစ်တလင်း(သို့) မိုးကာခင်းတွင် နေလှန်းပါက အထူ ၂ လက်မထက် မပိုပဲ ခပ်ပါးပါးလှန်းပါ။ ခြောက်သွေ့မှု ညီညာ စေရန် နာရီဝက်ခြား တစ်ကြိမ် အထက်အောက် လှန်ပေးပါ။
- မြင့်မားသော အပူချိန် (၅၄-၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် အထက်) တွင် အခြောက်မခံသင့်ပါ။
- စပါးစေ့အစိုဓာတ်သည် မျိုးစပါးအတွက် ၁၂% နှင့် ကြိတ်ခွဲ စားသုံးမည့် စပါးအတွက် ၁၄% ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
- မျိုးစေ့များကို သန့်စင်ပြီး လေလုံစွာ ပိတ်ထားနိုင်သော ပုံး၊ ပေပါ၊ အိတ် စသည့်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ ဟာမက်တစ် အိတ်) ထဲသို့ ထည့်သွင်းပါ။
- ထို့နောက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး ပိုးမွှား၊ ကြွက်၊ ငှက် တို့မှ ကာကွယ်ထားသော သိုလှောင်ရုံအတွင်း စနစ်တကျ သိုလှောင်ပါ။
- စပါးသိုလှောင်ထားရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖိတ်စင်ကျန်ရစ် ခဲ့သော စပါးစေ့များကို ချက်ချင်းသန့်စင်ဖယ်ရှားပါ။
- သိုလှောင်ရုံကို ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းအောင် ထားပါ။

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
စပါးသီးနှံဌာနခွဲ

ရေတက်၊ ရေကျ နှင့် ရေလွှမ်းနှစ်မြုပ်သော
နေရာများအတွက် သင့်လျော်သော
မိုးစပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ



၁။ သင့်လျော်သော စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်း

- စားသုံးမှု အရည်အသွေးနှင့် အထွက်နှုန်း ကောင်းမွန်သော ရေမြှုပ်ခံ စပါးမျိုးသန့်ကို ရွေးချယ် စိုက်ပျိုးပါ။

ရေတက်၊ ရေကျ၊ ရေလွှမ်းနှစ်မြုပ်သောနေရာများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးစပါးမျိုးများ

စပါးမျိုးအမည်	သက်တမ်း(ပတ်)	အပင်အမြင့် (မီတာ)	အနံ့ညံ့မှု(%)	စပါးမျိုးတည်ငံ့မှု	အထွက်နှုန်း (တန်)	လူတို့အသုံးပြုသော လက္ခဏာများ
ရွှေမြိုင်ခဲပေါင်း-၁ * (ဆင်နာ ဆင် ၁)	၁၄၃	၃-၃	၂၄-၀	လတ်မွှေးစင်	၈၀-၁၂၀	ရွှေမြိုင်ခဲ
ရွှေမြိုင်ခဲပေါင်း-၂ * (ဘီအာ ၁၁ - ဆင် ၁)	၁၄၀	၃-၆	၃၀-၂	ငစ်နီ	၈၀-၁၂၀	ရွှေမြိုင်ခဲ
ရွှေညိုတန် * ရွှေဘုဆင်	၁၃၆	၃-၉	၃၃-၂	စည်မထ	၈၀-၁၂၀	ရွှေမြိုင်ခဲ၊ ရေငုတ်ခံ
	စိုက်ပျိုးသည့် ဝယ်ယူပတ်	၄-၉	၂၂-၉	စည်မထ	၇၀-၁၀၀	ဆားခံ၊ ရေမြှုပ်ခံ၊ ရေသည့် အခြေအနေတွင်
နီကား	ပန်းပွင့် အောက်တိုဘာ တစ်ယပတ် ဝန်းပွင့်	၅-၀	၂၅-၇	လတ်မွှေးစင်	၇၀-၆၀	မျိုးညှောင်ပေါက်နိုင် ရွှေမြိုင်ခဲစားစပါး

၂။ ပျိုးဘောင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- ဒေသအလိုက် ရေတက်ရေကျ မှတ်တမ်းများအရ စိုက်ခင်း ရေလွှမ်းချိန်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးချိန် မတိုက်ဆိုင်စေရန် ပျိုးထောင်ချိန်ကို ချိန်ဆပျိုးထောင်ပါ။
- ပျိုးခင်းနေရာကို မြင့်သော၊ ရေမမြုပ်သော၊ သွင်းရေအတွက် ရေချိုအရင်းအမြစ်နှင့်နီးသော၊ လမ်းမီးရောင်နှင့်ဝေးသော၊ ရောဂါနှင့် ပေါင်းမြက်တို့ကင်းစင်သော၊ မြေဆီဩဇာထက် သန်သော၊ မြေနေရာကို ရွေးချယ်ပါ။
- အရည်အသွေးကောင်း မျိုးသန့်မျိုးစေ့ကို ပြာတီးသန့်စင်၍ ဆားရည်စိမ်ရွေးချယ်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ။
- မျိုးစေ့အား ၁ ရက် ရေစိမ်ပြီးမှ ၁ ရက် (သို့) ၂ ရက်၊ စာပါးစပ် ပြုချိန်အထိ မျိုးအုပ်ပါ။
- မျိုးစေ့ မချမီ ၂ - ၃ ရက်အလိုတွင် ပျိုးဘောင်ပြင်ဆင်ပါ။
- တစ်ဧကစိုက်ခင်းအတွက် မျိုးစေ့ ၈ ပြည်မှ ၁ တင်းနှင့် ပျိုးဘောင်ဧရိယာ ၀.၁ ဧက (စိမ့်မြောင်းမြေဧရိယာမပါ) လိုအပ်ပါသည်။
- မြေပြင်ချိန်တွင် ပျိုးခင်း ၀.၁ ဧက အတွက် မြေဆွေး (သို့) နွားချေးဆွေးလှည်းတစ်စီး ညီညာစွာထည့်ပါ။
- ၃ပေခြားတိုင်း ၁ ပေ (သို့) ၁ ပေခွဲ အကျယ် စိမ့်မြောင်း တစ်ကြောင်းဖော်ပါ။

- ပျိုးဘောင်မြေမျက်နှာပြင်ကို ညီညာအောင် ညှိပါ။
- ပျိုးဘောင်ဧရိယာ ၀.၁ ဧကအတွက် ၁၅ ပတ်လည် (N 15: P₂O₅ 15: K₂O 15) ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ ၄ ပြည် နို့ဆီဘူး ၂ ဘူး ညီညာစွာထည့်ပါ။
- အညှောင်ဖောက်ထားသော မျိုးစေ့များအား ပျိုးဘောင်ပေါ်သို့ ခပ်ကြာကြချပြီး (ပျိုးသက် ၃၅ မှ ၄၀ ရက်သားအတွက် ၃ပေ ပတ်လည် ပျိုးဘောင်ပေါ်တွင် မျိုးစေ့ နို့ဆီဘူး၊ ၁ ဘူး ခွဲနှုန်း) မြေဆွေး/နွားချေးဆွေး/ စပါးခွံဖွဲပြာ ခပ်ပါးပါး ဖုံးအုပ်ပါ။
- ပျိုးဘောင်ကို အမြဲစိုအောင် ရေထိန်းထားပါ။ ပျိုးကြပြီး ၅- ၇ ရက်မှ စ၍ ပျိုးပင်သက်တမ်းတစ်လျှောက် အပင်အမြင့်ပေါ် မူတည်၍ ရေခပ်ပါးပါးထား၍ ရေသွင်းရေထုတ် ပြုလုပ်ပါ။
- လိုအပ်ပါကပိုးမွှား၊ ရောဂါကို စနစ်တကျ ကာကွယ်နှိမ်နင်းပါ။ ပျိုးမနုတ်မီ ၇ - ၁၀ ရက်ခန့်အလိုတွင် ပျိုးဘောင်ဧရိယာ ၀.၁ ဧက အတွက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ၄ ပြည် နို့ဆီဘူး ၂ ဘူး ရေဖျော်လောင်း (သို့) ကြပက်ကျွေးပါ။
- ရွှေ့ပြောင်းမစိုက်မီ ပျိုးဘောင်ကို ပေါင်းကင်းစင်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
- ပျိုးနုတ်ခါနီးအချိန်တွင် ရေသွင်းပေးခြင်းဖြင့် ပျိုးနုတ်ရ လွယ်ကူစေပြီး ပျိုးပင်များ ဒဏ်ရာရမှု သက်သာစေပါသည်။
- ပျိုးနုတ်ရာတွင် အမြစ်များ မပြတ်ရန် သတိထားရမည်။



၃။ စိုက်ခင်းမြေပြင်ခြင်း

- စပါးပြောင်းရွှေ့မစိုက်မီ ၁ လခန့်ကြိုတင်၍ မြေပြင်ပါ။
- မိုးရွာပြီး (သို့မဟုတ်) လုံလောက်သည့် အစိုဓာတ်ရရှိချိန်တွင် ထယ်အနက် ၆ - ၈ လက်မခန့် ထယ်ထိုးပါ။
- ထယ်ထိုးပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် ထွန် ၂ စပ်မွှေပါ။
- ပထမအကြိမ်ထွန်မွှေပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် ဒုတိယအကြိမ် ထွန် ၂ စပ်မွှေပါ။
- ဒုတိယအကြိမ်ထွန်မွှေပြီး တစ်ပတ်ခန့် (သို့) ပြောင်းရွှေ့မစိုက်မီ ၁ ရက် အလိုတွင် နောက်ဆုံးအကြိမ် ထွန် ၂ စပ် မွှေပါ။

- နောက်ဆုံးထွန် ၂ စပ်၏ ကြားတွင် မြေခံမြေဩဇာကို ညီညာစွာ ကြပက်ပါ။
- ကြမ်းတုံးရိုက်၍ မြေကို ညီညာအောင်ညှိပါ။



၄။ စိုက်စနစ် (က) ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း

- သက်လတ်စပါးမျိုးများအတွက် ပျိုးသက် ၃၀ ရက်သား၊ ရေမြှုပ်မည်ဆိုလျှင် ၃၅ ရက်သားစိုက်ပါ။
- သက်ကြီးစပါးမျိုးများအတွက် ပျိုးသက် ၃၅ - ၄၀ ရက်သား၊ ရေမြှုပ်မည် ဆိုလျှင် ၄၅ ရက်သားစိုက်ပါ။
- မြေခံမြေဩဇာမထည့်သွင်းမီနှင့် ရွှေ့ပြောင်းမစိုက်မီ အချိန် တို့တွင် ကွင်းအတွင်းမှ ရေထုတ်ပါ။
- ရေအလွန်နက်၍ ကွင်းအတွင်းမှ ရေမထုတ်နိုင်မှသာလျှင် စူးထိုး၍ စိုက်ပါ။
- ပျိုးနုတ်ပြီး တစ်ရက်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးပါ။
- ပျိုးပင်အမြင့်သည် စိုက်ခင်းအတွင်းရှိ ရေမျက်နှာပြင်ထက် ပိုမြင့်နေရမည်။
- ကောက်ကွက် ၁ ကွက်လျှင် ပျိုးပင်လက်ဆ ၂ - ၃ ပင် သုံး၍ သမန်း အတွင်းသို့ ၁ - ၁.၅ လက်မထက် ပိုမနက်စေ စိုက်ပျိုးပါ။
- တန်းကြား ပင်ကြားကို ၈ လက်မ × ၆ လက်မ (သို့) ၈ လက်မ × ၈ လက်မဖြင့် စိုက်ပျိုးပါ။
- စိုက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း ကောက်ပင်ဖာပါ။

(ခ) အစိုသမန်းပြင်တွင် တိုက်ရိုက်အစေ့ချခြင်း

- ကောင်းမွန်သော မျိုးသန့်မျိုးစေ့ကို အသုံးပြု၍ မျိုးစေ့ နှုန်းထားမှာ တစ်ဧကလျှင် ဒေသမျိုးများအတွက် ၁ တင်း နှုန်းနှင့် အထွက်ကောင်းမျိုးများအတွက် ၁ တင်းခွဲနှုန်း အသုံးပြုပါ။
- မျိုးစေ့အား ၂၄ နာရီ ရေစိမ်၍ မျိုးညှောင်ထွက်အောင် ၄၈ မှ ၇၂ နာရီ မျိုးအုပ်ပါ။ သမန်းစားခြင်းမှ သက်သာရန်ဖြစ်ပါ သည်။

- အပင်သက်တမ်း (၂၅-၃၀) ရက် နောက်ပိုင်းတွင် ရေလွှမ်းဒဏ်ကို ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ချိန်ကို လိုအပ်သလို ချိန်ဆ စိုက်ပျိုးပါ။
- ကြပက်စိုက်ပျိုးရာတွင် သမန်းကောင်းအောင် ပြုပြင်ပြီး ရေထုတ်ပြီးစ (သို့) ရေစပ်စပ်အခြေအနေတွင် စိုက်ပျိုးပါ။
- မျိုးစေ့ချ ကိရိယာအသုံးပြု စိုက်ပျိုးရာတွင် သမန်းပြင်ညီညာအောင် ပြုလုပ်ပါ။ စာပါးစပ်ပြု မျိုးစေ့များကို အသုံးပြု၍ တစ်ဧကလျှင် မျိုးစေ့ တစ်တင်းနှုန်း အသုံးပြု၍ မျိုးစေ့ချ ကိရိယာကို ချိန်ညှိ စိုက်ပျိုးပါ။

၅။ မြေဩဇာကျွေးခြင်း

အသုံးပြုရမည့်အချိန်	တစ်ဧကအတွက်မြေဩဇာနှုန်းထား
မြေပြင်ချိန်	တီစူပါ ၁/၄ အိတ်မှ ၁/၂ အိတ် (၁၂.၅ မှ ၂၅ ကီလို) ပိုတက်ရှ် ၁/၄ အိတ်မှ ၁/၂ အိတ် (၁၂.၅ မှ ၂၅ ကီလို)
အပင်ပွားစည်းချိန် (သို့) ရေမြှုပ်နေပါက ရေကျပြီး ၇ ရက်အကြာ*	ယူရီးယား ၁/၂ အိတ် (၂၅ ကီလို) ပိုတက်ရှ် ၁/၄ အိတ် (၁၂.၅ ကီလို)
ပထမအကြိမ်ထည့်ပြီး ၁၅ - ၂၀ ရက်	ယူရီးယား ၁/၄ အိတ် (၁၂.၅ ကီလို)
ဖုံးတုံးလုံးတုံးမတိုင်မီ ၅ - ၆ ရက်အလို	ယူရီးယား ၁/၄ အိတ် (၁၂.၅ ကီလို) ပိုတက်ရှ် ၁/၄ အိတ်မှ ၁/၂ အိတ် (၁၂.၅ မှ ၂၅ ကီလို)

၆။ ရေသွင်းရေထုတ် ပြုလုပ်ခြင်း

- တာရီး၊ တံခံနှင့် ရေသွင်းရေထုတ် ရေတံခါးများကို တစ်ကွင်းတစ်စပ်အတွင်းရှိ တောင်သူများပူးပေါင်း၍ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ပြုလုပ်၊ ပြင်ဆင် မွမ်းမံပါ။
- ရေသွင်း၊ ရေထုတ်လွယ်ကူစေရန် လယ်ကြားမြောင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
- ရေစိမ့်ခံနွဲ့မှုကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စိုက်ကွင်း မြေမျက်နှာပြင်ကို ညီအောင်ညှိပါ။